



予防接種一覽表

<その他の予防接種についてはご相談ください>

ワクチン	種類	対象	接種回数・方式	副反応と注意事項	他の接種との間隔
結核 B. C. G.	生	生後3ヶ月～ (3～6ヶ月が望ましい)	1回 *当院では経皮式(日本と同じ スタンプ式)を採用しています。	1ヶ月位に針跡が一時的に膿疱に なることがあります。	4週間以上
ポリオ POLIO	生	生後3ヶ月～ (3～18ヶ月が望ましい)	6週間隔で3回(経口) *日本の定期では2回	嘔吐を避けるため服用前後30分は 飲食を避けてください。下痢症状が あるときは延期してください。	4週間以上
	不	子供 (生後2カ月～) 大人	2回目、3回目は1～2カ月ごと。4回目は 3回目終了から1年後。 ①一度もポリオ予防接種を受けていない人 (子供の時含め)は3回接種。2回目は 1回目から1～2ヶ月後、3回目は2回 目から6～12ヶ月後。 ②ポリオ危険地域に行く方などで追加接種 希望の場合は基本は2回接種ただし、時間 が無いなどの場合は最低でも1回追加接 種が必要。2回追加接種する場合は1回目 から1カ月後に2回目接種。	接種部位の発赤、痛 み、腫れ、まれに発 熱を伴います。	1週間以上
三種混合 D. P. T. (ジフテリア・百日咳・破傷風) 二種混合 D. T. (ジフテリア・破傷風)	不	1期 初回: 生後3～48ヶ月 追加: 初回後12～18ヶ月 2期(二種混合): 11～12才	1期 初回: 3～8週間隔で3回 追加: 1回 2期(二種混合): 1回	一両日中に発熱や発赤をみることが あります。接種部位が腫れたり、し こりができてしばらく続くことがあ ります。	1週間以上
五種混合 (DPT・ポリオ・Hib)	不	生後2カ月以降～(3ヶ月 以降お勧め)	3回まで1ヶ月毎。3回目か ら1年後追加接種	接種部位の発赤、痛み、腫れ、まれ に発熱や倦怠感、吐き気を伴います。	1週間以上
麻疹(はしか) MEASLES	生	1期: 生後1才～ (12～24ヶ月が望ましい) 2期: 5～6才	1期: 1回 (麻疹は生後10ヶ月～1才未満 に1回目接種した場合は追加 接種1回) 2期: 1回	接種後8～12日後に1～3日間の発 熱、発疹がみられることがあります。	4週間以上
風疹(三日ばしか) RUBELLA	生	1期: 生後12ヶ月～ (12～36ヶ月が望ましい) 2期: 5～6才	1期: 1回 2期: 1回	副反応はほとんどありません。 ※接種後約2カ月は妊娠を避けてく ださい。	4週間以上
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) MUMPS	生	1才～ (2～3才が適当)	1回	接種後2～3週間後に軽い風邪症状 や耳下腺の腫れがみられることがあ ります。	4週間以上
MMR (麻疹・風疹・ 流行性耳下腺炎)	生	1期: 生後12～18ヶ月 (15ヶ月が望ましい) 2期: 5～6才	1期: 1回、2期: 1回	まれに発疹、発熱が接種後5～12日 後にみられることがあります。	4週間以上
ヒブ (インフルエンザ菌b型) Hib	不	生後6週～5歳	接種を開始する時点での月 齢・年齢によって接種回数が異 なります。(お問い合わせください。)	接種部位の発赤、腫脹、痛みや、発 熱など、また、まれにアレルギー反 応がみられることがあります。	1週間以上
肺炎球菌 Prevenar	不	生後2カ月～9歳	接種を開始する時点での月 齢・年齢によって接種回数が異 なります。(お問い合わせください。)	接種部位の発赤、腫脹、痛みや、発 熱など、また、まれにアレルギー反 応がみられることがあります。	1週間以上
ロタウイルス ROTA VIRUS	生	生後6週～24週	2回接種。1回目接種後 4週間あけて2回目接種	接種後まれに食欲不振、下痢、吐き 気、発熱を伴うことがあります。	4週間以上
水痘(水ぼうそう) CHICKENPOX	生	1才～	1回	まれに発疹、発熱、頭痛、倦怠感を 認めることがあります。※接種後2 カ月は妊娠を避けてください。	4週間以上
日本脳炎 JAPANESE ENCEPHALITIS	不	1才～ (3才以上が適当)	1～4週間隔で1期初回2回。 1年後に1期追加1回。 3年間隔で1回ずつ。	接種部位に発赤、腫脹、硬結をみる ことがあります。	1週間以上
ヒトパピローマウイルス HPV	不	10～20代の女性 (11～12才が最も適当です。そ れ以上でも可能ですので、医 師にご相談ください。)	3回接種。2回目は1回目の 1ヶ月後、3回目は2回目の 5ヶ月後。	接種部位に発赤、痛み、腫脹がみら れることがあります。まれにアレルギ ー反応がみられます。接種期間中は 妊娠を避ける必要があります。	1週間以上
A型肝炎 HEPATITIS A	不	1才以上	6ヶ月間隔で2回接種	副反応はほとんどありません。	1週間以上
B型肝炎 HEPATITIS B	不	0才以上	合計3回接種。2回目接種 は1回目の1ヶ月後。3回 目接種は2回目の5ヶ月後	副反応はほとんどありません。	1週間以上
A型肝炎・B型肝炎 混合ワクチン	不	大人(16才以上) 小人(1才以上)	2回接種。2回目は6～12カ月後	副反応はほとんどありません。	1週間以上

インフルエンザ INFLUENZA	不	生後6ヶ月～	9歳以下は4～6週間隔で2回接種。10歳以上は1回接種。※流行期までに2回目の接種が終了するようにしてください。	接種部位に痛み、発赤、腫脹がみられることがあります。	1週間以上
破傷風 TETANUS	不	0才以上	4～8週間隔で2回 その後6～18ヶ月後に1回	接種部位に発赤、腫脹がみられることがあります。	1週間以上
狂犬病 RABIES	不	狂犬病常在地に渡航する人	3回接種。2回目は1週間後 3回目は2回目の3週間後 1年後に追加接種	接種部位に発赤、硬結がみられることがあります。	1週間以上
腸チフス TYPHOID	不	腸チフス感染地に渡航する人(2才以上)	1回 (約3年間有効)	接種部位に発赤、腫脹がみられることがあります。	1週間以上

※マラリアは予防薬がございます。

※「生」は生ワクチン、「不」は不活化ワクチンを表します。通常、生ワクチンと不活化ワクチンは同時接種不可です。(三種混合とポリオについては同時接種可能です。) また、生ワクチン接種後約2カ月間は妊娠を避けてください。

(2011年11月25日改定。情報は変更されることがあります。)