

## 予防接種一覧表

当クリニックでは以下の予防接種を承っています。その他の予防接種についてはお問合せください。

ワクチン	種類	対象	接種回数・方式	副反応と注意事項	他の接種との間隔
<b>結核</b> B. C. G.	生	生後3か月～	1回 *当院では経皮式（日本と同じスタンプ式）を採用しています。	1か月後に針跡が一時的に膿疱になることがあります。	4週間以上
<b>ポリオ</b> POLIO	不	生後8週以降 1期追加： 3回目から1年後	4回接種。 3回目まで4～8週間隔 1期追加：1回 *1期追加後は5年毎の追加が望ましい	接種部位の発赤、腫脹、硬結、まれに発熱を伴うことがあります。	1週間以上
<b>五種混合</b> (破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・ヒブ)	不	生後2か月～ 1期追加：3回目から6～12か月後	4回接種。 3回まで1か月間隔。 3回目から6～12か月後追加接種。	接種部位の発赤、腫脹、硬結、まれに発熱、倦怠感、吐き気を伴うことがあります。	1週間以上
<b>三種混合 Tdap</b> (破傷風・ジフテリア・百日咳)	不	2期：11～12歳（日本） 10～11歳（シンガポール）	2期：1回	一両日中に発熱や発赤をみる場合があります。接種部位が腫れたり、しこりができてしばらく続くことがあります。	1週間以上
<b>流行性耳下腺炎</b> (おたふくかぜ) MUMPS	生	1期：12～15か月 2期：5～6歳推奨	2回	接種後2～3週間後に軽い風邪症状や耳下腺の腫れがみられることがあります。*避妊期間については医師とご相談ください。	4週間以上
<b>MMR</b> (麻疹・風疹・流行性耳下腺炎)	生	1期：12～18か月（日本） 12か月（シンガポール） 2期：5～6歳（日本） 15か月～18か月（シンガポール）	1期：1回、2期：1回	まれに発疹、発熱が接種後5～12日後にみられることがあります。*接種後約1か月は妊娠を避けてください。	4週間以上
<b>ヒブ</b> (インフルエンザ菌b型) Hib	不	生後6週～5歳	接種を開始する時点での月齢・年齢によって接種回数が異なります。（お問い合わせください。）	接種部位の発赤、腫脹、痛みや、発熱など、また、まれにアレルギー反応がみられることがあります。	1週間以上
<b>肺炎球菌</b> Prevenar	不	生後2か月～	接種を開始する時点での月齢・年齢によって接種回数が異なります。（お問い合わせください。）	接種部位の発赤、腫脹、痛みや、発熱など、また、まれにアレルギー反応がみられることがあります。	1週間以上
<b>ロタウイルス</b> ROTA VIRUS	生	生後6週～24週	4週間隔で2回接種	接種後まれに食欲不振、下痢、吐き気、発熱を伴うことがあります。	4週間以上
<b>水痘</b> (水ぼうそう) CHICKENPOX	生	1歳～	2回接種。 2回目は6～12か月後。	まれに発疹、発熱、頭痛、倦怠感を認めることがあります。*接種後1か月は妊娠を避けてください。授乳中の場合は接種後1か月は断乳してください。	4週間以上
<b>日本脳炎</b> JAPANESE ENCEPHALITIS	不	1期：3～4歳 2期：9～12歳 状況により6か月から接種可	3回接種。 2回目は1回目の4週間後、 3回目は2回目の1年後。	接種部位に発赤、腫脹、硬結をみることがあります。	1週間以上
<b>ヒトパピローマウイルス</b> HPV	不	9～20代の女性	3回接種。2回目は1回目の1か月後、3回目は2回目の5か月後。 *9～13歳は2回接種でも可。（2回目は6か月後）	接種部位に発赤、痛み、腫脹がみられることがあります。まれにアレルギー反応がみられます。接種期間中は妊娠を避ける必要があります。	1週間以上
<b>A型肝炎</b> HEPATITIS A	不	1歳以上	6か月間隔で2回接種	強い副反応はほとんどありません。	1週間以上
<b>B型肝炎</b> HEPATITIS B	不	0歳以上	3回接種。2回目接種は1回目の1か月後。3回目接種は2回目の5か月後	強い副反応はほとんどありません。	1週間以上
<b>A型肝炎・B型肝炎混合ワクチン</b>	不	大人（16歳以上） 小人（1歳以上）	2回接種。2回目は6～12か月後	強い副反応はほとんどありません。	1週間以上

インフルエンザ INFLUENZA	不	生後 6 か月～	9 歳以上: 1 回接種 8 歳以下: 今まで同シーズンに 2 回接種したことが無い場合は 4 週間間隔で 2 回接種。ある場合は 1 回接種。	接種部位に痛み、発赤、腫脹がみられることがあります。	1 週間以上
破傷風 TETANUS	不	0 歳以上	3 回接種。4～8 週間隔で 2 回、その後 6～12 か月後に 1 回。	接種部位に発赤、腫脹がみられることがあります。	1 週間以上
狂犬病 RABIES	不	狂犬病常在地に渡航する人	3 回接種。2 回目は 1 週間後、3 回目は 2 回目の 3 週間後。3 回目から 2～5 年毎に追加接種。	接種部位に発赤、硬結がみられることがあります。	1 週間以上
腸チフス TYPHOID	不	腸チフス感染地に渡航する人(2 歳以上)	1 回 (約 3 年間有効)	接種部位に発赤、腫脹がみられることがあります。	1 週間以上
黄熱病 Yellow Fever	生	9 か月以上 (60 歳以上要相談)	1 回(生涯有効) 接種 10 日後より有効。	接種部位にまれに腫れ、発赤、痛み、また、吐き気がみられることがあります。 ※妊娠中・授乳中の方は避けてください。 ※コレラの予防接種とは 3 週間以上間隔を開けてください。	4 週間以上

※マラリアは予防薬がございます。

※ツベルクリン反応も承っています。(予約制)

※「生」は生ワクチン、「不」は不活化ワクチンを表します。

#### 予防接種を受ける方、保護者の方へ

- 予防接種は体調の良い時を選んで受けましょう。
- 小児の場合、保護者が問診票を記入し、母子手帳と一緒にご提出ください。無い場合には、予防接種を受けられないことがあります。また、三つ以上の予防接種を同時にご希望の場合は医師とご相談ください。
- 何かアレルギー(例: 卵、鶏肉)のある方、妊娠中の方はお申し出ください。
- 接種後 30 分は院内でお子様の様子をよく観察してください。
- 副反応がひどい場合はご連絡ください。
- 規定間隔より早く受けられた場合は効果が不十分なことがあります。
- 予防接種は原則として予約制とさせていただきます。
- ご不明の点はお問い合わせください。

## JGH ジャパン グリーン クリニック

290 Orchard Road #10-01 Paragon, Singapore 238859

Tel: 6734 8871 Fax: 6733 1213

e-mail: [reception@japan-green.com.sg](mailto:reception@japan-green.com.sg)

Web: [www.japan-green.com.sg](http://www.japan-green.com.sg)

診療科目: 外来診察(小児科・内科・整形外科・外科・婦人科・眼科\*・他一般)、予防接種、医療検査、健康診断、理学療法、医療相談

\*印は英語診察(日本語通訳)となります。



#### ご案内

- \* MRT オーチャード駅 またはサマセット駅から徒歩10～15分です。
- \* エレベーターは Tower 1のLobby Eをご利用ください。
- \* 初診の方はパスポート またはシンガポールのIDカードをお持ちください。

※記載された情報は 2020 年 1 月 20 日現在のものです。対象年齢、接種回数・方式、および注意事項は各ワクチン取扱説明書に基づきます。情報は変わることがありますので、接種の前に最新情報をご確認ください。