

## 予防接種一覧表

当クリニックでは以下の予防接種を承っています。（その他の予防接種についてはお問合せください。）

定期/任意	ワクチン	種類	対象	接種回数・方式	副反応と注意事項
定(日) 定(シ)	結核 BCG	生	生後5~7か月 *シンガポールでは出生直後に注射式のワクチンを接種	1回接種 *当クリニックでは経皮式(日本と同じスタンプ式)を採用しています。	1か月後位に針跡が一時的に膿疱になることがあります。 1週間以内に赤みが強くなる場合は、医師にご相談ください。
定(日) 定(シ)	五種混合 5-in-1 (破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ・ヒブ)	不	生後2か月~5歳未満	1期4回接種 3回目まで2か月間隔 4回目:生後18か月 (1歳を過ぎて3回目から6か月以上経ていれば接種は可能)	
定(日) 定(シ)	三種混合 Tdap (破傷風・ジフテリア・百日咳)	不	4歳以上	任意:日本5~6歳1回追加接種推奨 2期:シンガポール10~11歳1回 日本 11~12歳1回	
任(日) 定(シ)	ポリオ POLIO	不	0歳以上	日本:5~6歳1回推奨 *1975~1977年生まれの方は3回接種推奨(1~2か月後に2回目その後6か月後に3回目) シンガポール:10~11歳1回	
定(日) 定(シ)	肺炎球菌 PNEUMOCOCCUS	不	生後2か月以上	4回接種 3回目まで2か月間隔 4回目:生後12か月	
定(日) 任(シ)	ロタウイルス・1価 ROTA VIRUS	生 (経口)	生後6週~24週	4週間以上あけて2回接種 1回目:8~15週未満 2回目:15~24週	接種後まれに食欲不振、下痢、吐き気、発熱を伴うことがあります。
定(日) 定(シ)	MMR (麻疹・風疹・流行性耳下腺炎) Measles, Mumps, Rubella	生	1歳以上 *1歳未満で接種した場合、1歳になって打ち直し必要	2回接種 1回目:シンガポール12か月(日本12~18か月) 2回目:シンガポール15か月(日本5~6歳)	まれに発疹、発熱が接種後5~12日後にみられることがあります。 ※接種後約1か月は妊娠を避けてください。
任(日)	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) MUMPS	生	1歳以上 *MMRを2回接種済みの場合は不要	2回接種 1回目:シンガポール12か月(日本12~18か月) 2回目:シンガポール15か月(日本5~6歳)	接種後2~3週間後に軽い風邪症状や耳下腺の腫れがみられることがあります。 ※接種後約1か月は妊娠を避けてください。
定(日) 定(シ)	水痘 (水ぼうそう) CHICKENPOX	生	1歳以上	2回接種 1回目:シンガポール12か月(日本12~15か月) 2回目:シンガポール15か月(日本18~23か月)	まれに発疹、発熱、頭痛、倦怠感を認めることがあります。 ※接種後1か月は妊娠を避けてください。
定(日) 任(シ)	日本脳炎 JAPANESE ENCEPHALITIS	不	生後6か月以上	1期:3~4歳3回接種 2回目は1回目の4週間後 3回目は2回目の1年後 2期:9~12歳1回	
定(日) 定(シ)	ヒトパピローマウイルス HPV	不	9~26歳の女性 上記以外の方は要相談	3回接種 2回目は1回目の2か月後 3回目は2回目の4か月後 *9-14歳については2回接種という方法もあります。医師にご相談ください。	接種期間中は妊娠を避ける必要があります。
任(日) 任(シ)	A型肝炎 HEPATITIS A	不	1歳以上	6か月間隔で2回接種	
定(日) 定(シ)	B型肝炎 HEPATITIS B	不	0歳以上	シンガポール定期接種:生後0、2、6か月 3回接種 2回目接種は1回目の1か月後 3回目接種は2回目の5か月後	
—	A型肝炎・B型肝炎 混合ワクチン	不	大人(16歳以上) 小人(1歳以上)	3回接種 2回目接種は1回目の1か月後 3回目接種は2回目の5か月後 2回接種 2回目は6~12か月後	

任(日) 任(シ)	インフルエンザ INFLUENZA	不	生後6か月	9歳以上：1回接種 8歳以下：今まで同シーズンに2回接種したことが無い場合は4週間間隔で2回接種 ある場合は1回接種	
—	破傷風 TETANUS	不	0歳以上	3回接種 4~8週間隔で2回 その後6~12か月後に1回	
任(日) 任(シ)	狂犬病 RABIES	不	狂犬病常在地に渡航する人(0歳以上)	3回接種 2回目は1週間後 3回目は2回目の3週間後 3回目から2~5年毎に追加接種	
任(日) 任(シ)	腸チフス TYPHOID	不	腸チフス感染地に渡航する人(2歳以上)	1回接種 (約3年間有効)	

※マラリアは予防薬がございます。

※黄熱も承っています。(1回接種)

※ツベルクリン反応も承っています。ツベルクリン皮内注射と48時間後の判定の2回受診が必要です。

結核検診としてはクオンティフェロン(血液検査)も可能ですので、ご相談ください。

※「定」は定期接種ワクチン、「任」は任意接種ワクチンを表します。

(MMR ワクチンについては日本ではMR ワクチンが定期接種のため定期接種と掲載しております。)

※「生」は生ワクチン、「不」は不活化ワクチンを表します。

※2020年10月より異なる予防接種の接種間隔が改訂され、注射の生ワクチンと注射の生ワクチンの場合のみ4週間間隔をあげ、それ以外の組み合わせの場合は接種間隔を開けなくてよいこととなりました。

#### 予防接種を受ける方、保護者の方へ

- 予防接種は体調の良い時を選んで受けましょう。
- 小児の場合、保護者が問診票を記入し、母子手帳と一緒に提出ください。無い場合には、予防接種を受けられないことがあります。また、5つ以上の予防接種を同時にご希望の場合、接種可能ですが一度医師とご相談ください。
- 何かアレルギー(例：卵、鶏肉)のある方、妊娠中の方はお申し出ください。
- 接種後30分は院内でお子様の様子をよく観察してください。
- 各ワクチン接種後の一般的な副反応は接種部位の発赤、腫脹、硬結、まれに発熱を伴うことがあります。
- 副反応がひどい場合はご連絡ください。
- 規定間隔より早く受けられた場合は効果が不十分なことがあります。
- すべての予防接種は原則として予約制とさせていただきます。
- ご不明の点はお問い合わせください。

## ジャパン グリーン クリニック JAPAN GREEN CLINIC

290 Orchard Road #10-01 Paragon, Singapore 238859

Tel: 6734 8871 Fax: 6733 1213 e-mail: [reception@japan-green.com.sg](mailto:reception@japan-green.com.sg) Web: [www.japan-green.com.sg](http://www.japan-green.com.sg)

※記載された情報は2021年01月28日現在のもので、対象年齢、接種回数・方式、および注意事項は各ワクチン取扱説明書に基づきます。情報は変わることがありますので、接種の前に最新情報をご確認ください。